

نام و نام خانوادگی بیمار:.....

شماره پرونده:.....

**سئوالات پیش و پس آزمون برای ارزشیابی دوره های آموزش رفتارهای سالم جنسی**

در سئوالات زیر ممکن است بیش از یک گزینه صحیح باشد. لطفا پاسخ های صحیح را علامت بزنید.

الف - کدام یک از راه های زیر بیماری ایدز را منتقل نمی کند ؟

۱- استفاده از ظرف مشترک

۲- سرویس های مشترک بهداشتی (حمام ، استخر ، توالت)

۳- نیش حشرات

۴- مسافرت کردن به منطقه آلوده ( به شرط انجام ندادن رفتار پر خطر)

۵- همکار بودن با فرد آلوده

۶- هم سفر بودن با فرد آلوده در یک وسیله نقلیه

۷- آب خوری مشترک

۸- روبوسی و دست دادن ساده

۹- سرفه

۱۰- عطسه

۲/۵ نمره

ب- استفاده از کدام یک از ابزارها و وسایل زیر با احتمال انتقال آلودگی به ویروس هیپاتیت سی همراه است؟

۱- تیغ سلمانی

۲- مسواک

۳- خلال دندان

۴- ناخن گیر

۵- سرنگ و سر سوزن

۶- لیف - برس

۷- ظرف غذای مشترک ( کارد و چنگال و لیوان) که با مایع ظرفشویی شسته شده است.

۸- لوازم التحریر مشترک (خودکار و مداد) - لباس مشترک

۲ نمره

ج- در صورت درست استریل نکردن کدام یک از وسایل و ابزارهای زیر احتمال آلودگی به ویروس HIV وجود دارد؟

۱- خالکوبی (تاتو)

۲- ختنه

۳- سوراخ کردن گوش

۴- حجامت

۵- طب سوزنی

۶- دندانپزشکی و مامائی و جراحی و آزمایشگاه

۷- ابزار برنده آلوده به خون

۱/۷۵ نمره

د - کدام یک از وسایل زیر احتمال انتقال ویروس هیپاتیت سی را در معتادان بالا می برد؟

۱- سوزن و سرنگ مشترک استفاده شده

۲- وسایل مشترک استفاده شده برای جوشاندن مواد مثل قاشق یا ملاقه

۳- کبریت

۴- آب - ظرف آب

۵- زرورق هروئین

۶- فیلتر سیگار استفاده شده

۱/۵ نمره

ه - کاندوم چه کاری را انجام می دهد؟

۱- می تواند مانع از انتقال ویروس ایدز از راه تماس جنسی مهبل (از جلو) شود.

۲- می تواند مانع از انتقال ویروس ایدز از راه تماس جنسی مقعدی (از پشت) شود.

۳- می تواند مانع از انتقال ویروس هیپاتیت B از راه تماس جنسی مهبل (از جلو) شود.

۴- می تواند مانع از انتقال ویروس هیپاتیت B از راه تماس جنسی مقعدی (از پشت) شود.

۵- همه موارد فوق درست است.

۶- پاسخ درست را نمی دانم.

۰/۷۵ نمره

و - کدام یک از جملات زیر درست است؟

۱- کاندوم را می توانیم بشوئیم و مجددا استفاده کنیم.

۲- از روی ظاهر افراد نمی توان فهمید که مبتلا به ایدز یا هیپاتیت سی هستند.

۳- در صورت داشتن ترشح، خارش و سوزش در ناحیه تناسلی و درد هنگام نزدیکی مصرف دارو را باید تا آخر دستور پزشک ادامه دهیم و نباید به محض رفع علائم دارو را قطع کنیم.

۴- وجود یک آزمایش ایدز منفی دلیل قطعی بر عدم آلودگی نیست.

۵- مدتی بین آلودگی و مثبت شدن نتیجه آزمایش آلودگی به ویروس ایدز طول می کشد.

۶- بیماری هیپاتیت سی همیشه خود را به صورت زردی و ناتوانی شدید ظاهری نشان می دهد.

۷- با رعایت دقیق موازین بهداشت عمومی و اصول رفتار سالم جنسی می توان به راحتی با بیمار مبتلا به هیپاتیت سی زندگی کرد.

۸- بیمار مبتلا به هیپاتیت سی باید ناخن گیر، لیف، برس، شانه، مسواک و تیغ جداگانه داشته باشد.

۹- در بهبود علائمی مانند خارش، ترشح غیر طبیعی و سوزش دستگاه تناسلی درمان هر دو طرف شریک جنسی الزامی است.

۱۰- انجام مشاوره قبل و بعد از آزمایش خونی ایدز و هیپاتیت الزامی است.

۲/۵ نمره

## راهنمای انجام پیش آزمون و پس آزمون در برنامه کاهش آسیب

۱- اکثر سئوالات به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر آزمون، نکات کلیدی در عناوین آموزشی یک بار قبل از بحث و یک بار بعد از ارائه آموزش برای خواننده تکرار شود.

۲- در مواردی که مراجعان بی سواد هستند سئوالات را تک به تک و در جمع بخوانید و تعداد موارد پاسخ درست و غلط را به صورت سرشماری جمع زده و در جدول ثبت کنید.

۳- نمره کلی آزمون ۱۱ می باشد هر جزء سؤال های موجود، به جز سؤال (ه) ۰/۲۵ بام دارد.

لذا انتظار می رود که کلیه نمرات پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس ۱۱ نمره ای ثبت و گزارش شود.